



# ЖАРА, СТОП ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС



## ТЕЛЯТА

### ПРИЗНАКИ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА

- Повышенная частота дыхания в сравнении с нормальной (24–36 дыхательных движений в минуту)
- Дыхание открытым ртом
- Обезвоживание
- Потеря аппетита
- Температура тела телёнка  $>39,5^{\circ}\text{C}$
- Снижение двигательной активности
- Больше времени в положении стоя, меньше лежат
- Снижение потребления молока
- Снижение потребления стартерного корма
- Повышение потребления воды
- Увеличение заболеваемости и смертности
- Снижение скорости роста из-за снижения потребления концентратов и повышения затрат на основной обмен

### СОДЕРЖАНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Обеспечьте наличие прохладного, затенённого и вентилируемого места для содержания телят
  - Плексигласовые/пластиковые куполообразные домики могут превратиться в сауны, соломенная подстилка способна удерживать тепло
  - Лучше использовать песок, опилки, рисовую шелуху
- Для создания тени и защиты от солнечного излучения можно использовать большие куски ткани
  - Блокируют не менее 80% УФ света
- Хорошо, если высокая крыша позволяет обеспечить хороший воздухообмен
- Приподнимайте пластиковые домики над полом для улучшения циркуляции воздуха
- Обеспечьте достаточно места вокруг отдельных секций/домиков с телятами для хорошей циркуляции воздуха
- Уменьшите плотность содержания в групповых секциях и обеспечьте всем животным возможность отдыха в тени

### КОРМЛЕНИЕ

- Обеспечьте дачу воды и концентратов хорошего качества
  - Убедитесь, что телята полностью потребляют молоко, и в середине дня давайте им питьё с электролитами
    - Восполнение потери жидкости критически важно
  - Обеспечьте доступ к воде и корму в тени
  - Увеличьте количество корма, скармливаемого утром
  - Дневное кормление отложите до вечера
- 
- Скармливайте Био-Мос® или Актиген™ для поддержания функции кишечника телят в периоды увеличения стресса